




Что такое кишечные инфекции?

- Кишечные инфекции – это группа заразных заболеваний, которые, в первую очередь, повреждают пищеварительный тракт:

К кишечным инфекциям относятся:

- ✓ дизентерия ,
 - ✓ сальмонеллёзы, вызываемые многочисленными возбудителями,
 - ✓ брюшной тиф,
 - ✓ холера,
 - ✓ иерсиниозы,
 - ✓ ротавирусная инфекция,
 - ✓ пищевые токсиционы, которые возникают при попадании в организм различных кишечных бактерий и токсинов.
- Самое опасное из них – это холера.**





•**Острые кишечные инфекции (ОКИ) -**

по терминологии ВОЗ - **диарейные болезни**- большая группа инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, вызываемых патогенными бактериями условно-патогенной микрофлорой , вирусами , простейшими основными симптомами которых являются, интоксикация, диарея, обезвоживание.

Актуальность. ОКИ являются одними из самых актуальных инфекционных заболеваний после гриппа и ОРВИ.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется до 1-1,2 млрд. диарейных заболеваний, умирает 5 - 10 млн. человек, преимущественно дети.

Высокая заболеваемость, эпидемические вспышки обусловлены неблагоприятными условиями жизни людей, низким санитарным уровнем, миграционными процессами.

*



ДИЗЕНТЕРИЯ

ИЛИ БОЛЕЗНЬ

ВОЗБУДИТЕЛЬ - ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ ПАЛОЧКА

- ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ **(ОКИ)**,

«ГРЯЗНЫХ РУК».

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - ОТ 1 ДО 7 ДНЕЙ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ **ОКИ** НУЖНО:

1. ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ С 2-КРАТНЫМ НАМЫЛИВАНИЕМ:

- ПРИХОДЯ ДОМОЙ
- ПЕРЕД ЕДОЙ
- ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ
- ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА
- ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УБОРКИ, ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ
- ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

2. УПОТРЕБЛЯТЬ ТОЛЬКО КИПЯЧЕНУЮ ВОДУ

3. ХОРОШО ОБРАБАТЫВАТЬ И ОБДАВАТЬ КИПЯТКОМ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

4. РАЗДЕЛЫВАТЬ, ХРАНИТЬ И ПЕРЕНОСИТЬ СЫРЫЕ ПРОДУКТЫ ОТДЕЛЬНО ОТ ГОТОВЫХ – ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

5. ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК В ЖИЛИЩЕ И ВО ДВОРЕ

ПОМНИТЕ! ЧИСТОТА – СПАСЕТ ВАС ОТ БОЛЕЗНИ!



ОПОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫМИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ, С ЭКЗОГЕННЫМ ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ (инвазивная диарея)

- Эпидемический анамнез — употребление длительно и неправильно хранившихся продуктов, наличие гнойного мастита у матери.
- Острое начало заболевания после предельно короткого инкубационного периода.
- Повышение температуры тела до 38-39⁰С, резкое ухудшение состояния больного.
- Боли в животе с преимущественной локализацией в эпигастрии.
- Повторная рвота, тошнота.
- Стул жидкий энтеритического или колитического характера.
- Быстрая положительная динамика на фоне терапии.
- Изменения ОАК — лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево, повышение СОЭ.
- Выделение из рвотных масс, промывных вод, остатков пищи, кала УПМ.